

Prostudujte si klimagram Brna. Pro další místa vyberte jim odpovídající klimagramy a na jejich základě určete biom, převládající půdní typ dané oblasti, možné hospodářské využití tamní krajiny a příklad tradiční stravy.

Místo	Klima gram	Biom	Půdní typ	Hospodářské využití	Tradiční strava
Ebolowa (2°55' s.š., 11°9' v.d., 640 m n. m.)	A	tropický deštný les	červozem a žlutozem	produkce dřeva; pěstování tropických plodin na plantážích	tropické ovoce, zelenina, maso menších lovených živočichů včetně hmyzu
Niamey (13°31' s.š., 2°7' v.d., 210 m n. m.)	B	savana	červozem a žlutozem	pastevectví	mléko a maso chovaných zvířat, ovoce, zelenina aj.
Ghardaia (32°29' s.š., 3°40' v.d., 570 m n. m.)	C	poušť	nevyvinuté půdy	velmi omezené	datle, mléko a maso chovaných zvířat
Cherson (46°38' s.š., 32°35' v.d., 25 m n. m.)	D	step	černozem	pěstování obilí	obilné placky, zelenina, mléko a maso chovaných i lovených zvířat
Krasnojarsk (56°0' s.š., 92°52' v.d., 260 m n. m.)	E	jehličnatý les (tajga)	podzol	produkce dřeva	maso lesních zvířat, lesní plody
Iqaluit (63°45' s.š., 68°31' z.d., 30 m n. m.)	F	tundra	málo vyvinuté půdy	velmi omezené	tulení maso, ryby, sobí mléko

Zdroj dat: <https://worldweather.wmo.int>

